

Pajareando por Cádiz

Autor Antonia Zamora Oviedo
Sunday, 13 de April de 2008

PAJAREANDO POR CÁDIZ

Durante la tercera semana de Marzo de 2008, estuvimos por Cádiz en plena época de migración.

Comenzamos por el Parque Natural de Los Alcornocales, bosques de alcornoques, quejigos, encinas, acebuches y bosques de riberas con alisos, fresnos, sauces y álamos.

Durante las varias rutas que realizamos por el parque destacaría dos zonas importantes y diferenciadas.

La primera, asociada a la multitud de embalses. Y la segunda en zonas boscosas

- Embalse de Barbate. Nuestro primer lugar de estancia fue en una casa a orillas del embalse, "Hacienda del Agua". Nos despertábamos y hasta el desayuno nos bajábamos al embalse a ver los bichejos que allí hubiese. Observamos en varios días, dos águilas pescadoras (*Pandion haliaetus*), una de ellas la vimos pescar y comerse tranquilamente su presa, espátulas (*Platalea leucorodia*) (3 ind), una pareja de cercetas carretotas (*Anas querquedula*), muchísimos azulones (*Anas platyrhynchos*) pastando en las laderas cercanas, patos cuchara (*Anas clypeata*), una garceta común (*Egretta garzetta*), garza reales (*Ardea cinerea*) (5 ind), andarríos grande (*Tringa ochropus*) (1 ind) y en la vegetación cercana: jilgueros (*Carduelis carduelis*), zorzales charlo (*Turdus viscivorus*), milanos negros (*Milvus migrans*), dos cuervos (*Corvus corax*), cigüeñas (*Ciconia ciconia*) y por las noches nos acompañaba el canto de varios mochuelos (*Athene noctua*).

- Ruta de "la saucedá al pico Aljibe", Ruta "Garganta oscura", Ruta "Río Hoz Garganta";

Las aves observadas fueron muy parecidas en todas las rutas, pero cabe destacar la ruta por la saucedá, un bosque plétórico de pajarillos cantando: Reyezuelos listados (*Regulus ignicapillus*), se dejaron ver hasta 5 ind, tres picogordos (*Coccothraustes coccothraustes*), petirrojos (*Erithacus rubecula*), agateadores comunes (*Certhia brachydactyla*), herrerillos (*Parus caeruleus*), carboneros comunes (*Parus major*), pinzones (*Fringilla coelebs*), jilgueros (*Carduelis carduelis*), mosquiteros común (*Phylloscopus collybita*), mitos (*Aegithalos caudatus*), tarabillas (*Saxicola torquata*), currucas capirotada (*Sylvia atricapilla*), cabecinegra (*Sylvia melanocephala*) y tomillera (*Sylvia conspicillata*), cuervos (*Corvus corax*), ratoneros (*Buteo buteo*) y cigüeñas (*Ciconia ciconia*).

En otra de las rutas, en dirección en este caso hacía el Embalse del Celemín observamos una veintena de buitres leonados (*Gyps fulvus*) dando cuenta de algún festín.

En esta zona visitamos unas pinturas rupestres, en la zona denominada “Tajo de las figuras”, en ella se observan aves parecidas a flamencos que nos indican algunas de las especies que habitaban la zona. Después de esto bajamos hacía el Sur, para observar el paso del estrecho y otras zonas cercanas a la costa.

- Antigua laguna de la Janda, esta zona ahora utilizada como campos de cultivo observamos faisanes (*Phasianus colchicus*) que se han naturalizado en la zona, y cerca de las zonas todavía inundadas observamos: calamones comunes (*Porphyrio porphyrio*) aproximadamente 20 individuos, es extraño ver tantos individuos juntos y tan cerca. Además vimos 2 aguiluchos laguneros (*Circus aeruginosus*), 1 garceta común (*Egretta garcetta*), 1 pareja de pato cuchara (*Anas clypeata*), cigüeñas (*Ciconia ciconia*), 1 andarríos grande (*Tringa ochropus*).

- Pinares de Barbate y acantilados cercanos, observamos un Halcón peregrino (*Falco peregrinus*), gaviotas patiamarillas (*Larus cachinnans*) y sombrías (*Larus fuscus*), pagazas piquirrojas (*Sterna caspia*), cormoranes grandes (*Phalacrocorax Carbo*)

- Playa de Bolonia y sierra de la Plata, Visitamos primero las ruinas romanas de Baelo Claudia, un pueblo pescador donde todavía quedan restos de la almadraba donde preparaban el atún pescado durante el paso en migración de estos. En los cortados de la Sierra de la Plata de estas comprobamos la presencia de buitres (*Gyps fulvus*), alimoche (*Neophron percnopterus*), currucas, pardillos (*Carduelis cannabina*), jilgueros (*Carduelis carduelis*), tarabillas (*Saxicola torquata*)

- Paso del Estrecho, desde los miradores del Ombligo y Cazalla (Tarifa), durante este periodo observamos culebreras europeas (*Circaetus gallicus*), que lo cruzan solas, 1 gavilán (*Accipiter nisus*) entre un grupo de milanos negros (*Milvus migrans*), especie más abundante y que cruzaba el estrecho en grupos de cientos, cigüeñas blancas (*Ciconia ciconia*) que también pasaban en grandes grupos. Y aguillillas calzadas (*Hieraetus pennatus*) que lo hacían en solitario.

- Playa de los Lances (Tarifa), todas las mañanas antes de desayunar paseábamos por la playa donde podíamos observar multitud de limícolas:

correlimos común (*Calidris alpina*), corregimos tridáctilo (*Calidris alba*), chorlitejos patinegros (*Charadrius alexandrinus*) y junto a ellos algún chorlitejo grande (*Charadrius hiaticula*) y chico (*Charadrius dubius*). Además grupos de lavanderas boyeras (*Motacilla flava*) con alguna blanca (*Motacilla alba*), y bisbitas comunes (*Anthus pratensis*), tarabillas (*Saxicola Torquato*), cogujadas montesinas (*Galerita theklae*). También se veían pequeños grupos de gaviota de audouin (*Larus audouinii*), charranes patinegros (*Sterna sandvicensis*), gaviotas sombrías (*Larus fuscus*) y patiamarillas (*Larus cachinnans*).

Además al atardecer observábamos como garcillas bueyeras (*Bulbucus ibis*) se acercaban a dormir dentro de Tarifa, después comprobamos el lugar, una plaza con 2 araucarias, las cuales no tenían hojas sino garcillas.

- Desembocadura del río Palmones. Esta zona esta entre Algeciras y la Línea de la Concepción, en una zona muy contaminada y una zona de la desembocadura con una parte de dunar estaba rodeada por las urbanizaciones. A pesar de todo esto, la diversidad de avifauna en enorme.

Observamos: Chorlito gris-*Pluvialis squatarola* (4 ind), Archibebe común- *Tringa totanus* (aprox 20), Archibebe claro-*Tringa nebularia* (2 ind), Gaviotas cabecinegras- *Larus melanocephalus* (2 ind) en plumaje nupcial, Gaviotas patiamarillas- *Larus cachinnans*, reidoras- *Larus ridibundus*, sombrías- *Larus fuscus*, Charranes patinegros- *Sterna sandvicensis* (10 ind), un charrán común- *Sterna hirundo*, Zarapitos reales- *Numenius arquata* (6 ind), chorlitejo patinegro- *Charadrius alexandrinus*, chorlitejo grande- *Charadrius hiaticula*, correlimos común-*Calidris alpina* y tridáctilo- *Calidris alba*.

Además realizamos una ruta en barco para observar cetáceos en paso y residentes así como aves oceánicas.

En este viaje observamos 2 grupos de calderones (*Globicephala melas*), varios grupos de delfines mulares (*Tursiops truncatus*) y varios delfines comunes (*Delphinus delphis*), también observamos 2 cachalotes (*Physeter catodon*) mientras permanecían en la superficie respirando.

En cuanto a avifauna observamos: Gaviotas patiamarillas (*Larus cachinnans*), Alcatraces atlánticos (*Morus bassanus*), Págallo grande (*Catharacta skua*), Pardela cenicienta (*Calonectris diomedea*) y dos grupos de frailecillos (*Fratercula arctica*).

